SNOHOMISH COUNTY

SNOHOMISHOVERDOSEPREVENTION

 A COMMUNITY COMING TOGETHER TO STOP SNOHOMISH COUNTY'S OPIOID EPIDEMIC

Snohomish 治疗资源

Evergreen 康复中心: (425) 493-5310

• Everett 和 Lynnwood 分部门诊治疗、戒瘾和药物辅助治疗。

Ideal Option: 1(877) 522-1275

Arlington、Everett 和 Mountlake Terrace 分部。药物辅助治疗、门诊服务、行为健康服务转诊。

社区卫生服务中心: (425) 789-3789 或 1(877) 382-4098

 Arlington、Edmonds、Everett、Lynnwood 分部防止药物 成瘾支持项目、心理健康服务和药物辅助治疗。

防止滥用阿片类药物

和医生谈谈不容易上瘾的止痛药。

如果您需要阿片类药物止痛,请咨询医生是否可以短期使用低剂量。获取 Narcan 鼻喷雾,带回家使用。

将药物锁起来,将非处方药和处方药收在带锁的瓶子、 盒子或柜子里锁起来。

回收未使用的、不想要的或过期的药物。致电1-844-633-7765 或扫描二维码访问网页www.med-project.org/locations。

求助热线和治疗资源



WA Recovery Helpline:

致电 1-866-789-1511 或发短信



Never Use Alone:

1-877-696-1996



Suicide & Crisis Lifeline:

致电 988 或发短信



Teen Link:

致电 1-866-833-6546 或发短信

有关当地治疗/康复资源的列表,请访问 https://snohomishoverdoseprevention.com/ find-treatment-or-support/或扫描二维码。



SNOHOMISH COUNTY

SNOHOMISHOVERDOSEPREVENTION

A COMMUNITY COMING TOGETHER TO STOP SNOHOMISH COUNTY'S OPIOID EPIDEMIC

Snohomish 治疗资源

Evergreen 康复中心: (425) 493-5310

• Everett 和 Lynnwood 分部门诊治疗、戒瘾和药物辅助治疗。

Ideal Option: 1(877) 522-1275

• Arlington、Everett 和 Mountlake Terrace 分部。药物辅助治疗、门诊服务、行为健康服务转诊。

社区卫生服务中心: (425) 789-3789 或 1(877) 382-4098

 Arlington、Edmonds、Everett、Lynnwood 分部防止药物 成瘾支持项目、心理健康服务和药物辅助治疗。

防止滥用阿片类药物

和医生谈谈不容易上瘾的止痛药。

如果您需要阿片类药物止痛,请咨询医生是否可以短期使用低剂量。获取 Narcan 鼻喷雾,带回家使用。

将药物锁起来,将非处方药和处方药收在带锁的瓶子、 盒子或柜子里锁起来。

回收未使用的、不想要的或过期的药物。致电 1-844-633-7765 或扫描二维码访问网页 www.med-project.org/locations。

求助热线和治疗资源



WA Recovery Helpline:

致电 1-866-789-1511 或发短信



Never Use Alone:

1-877-696-1996



Suicide & Crisis Lifeline:

致电 988 或发短信



Teen Link:

致电 1-866-833-6546 或发短信

有关当地治疗/康复资源的列表,请访问 https://snohomishoverdoseprevention.com/ find-treatment-or-support/或扫描二维码。



www.SnohomishOverdosePrevention.com

SNOHOMISH COUNTY

SNOHOMISHOVERDOSEPREVENTION

A COMMUNITY COMING TOGETHER TO STOP

Snohomish 治疗资源

Evergreen 康复中心: (425) 493-5310

• Everett 和 Lynnwood 分部门诊治疗、戒瘾和药物辅助治疗。

Ideal Option: 1(877) 522-1275

• Arlington、Everett 和 Mountlake Terrace 分部。药物辅助治疗、门诊服务、行为健康服务转诊。

社区卫生服务中心: (425) 789-3789 或 1(877) 382-4098

 Arlington、Edmonds、Everett、Lynnwood 分部防止药物 成瘾支持项目、心理健康服务和药物辅助治疗。

防止滥用阿片类药物

和医生谈谈不容易上瘾的止痛药。

如果您需要阿片类药物止痛,请咨询医生是否可以短期使用低剂量。获取 Narcan 鼻喷雾,带回家使用。

将药物锁起来,将非处方药和处方药收在带锁的瓶子、 盒子或柜子里锁起来。

回收未使用的、不想要的或过期的药物。致电 1-844-633-7765 或扫描二维码访问网页 www.med-project.org/locations。

求助热线和治疗资源



WA Recovery Helpline:

致电 1-866-789-1511 或发短信



Never Use Alone:

1-877-696-1996



Suicide & Crisis Lifeline:

致电 988 或发短信



Teen Link:

致电 1-866-833-6546 或发短信

有关当地治疗/康复资源的列表,请访问 https://snohomishoverdoseprevention.com/ find-treatment-or-support/或扫描二维码。



www.SnohomishOverdosePrevention.com

www.SnohomishOverdosePrevention.com

用药过量的体征和症状

- 皮肤苍白、发黏
- 没有呼吸/呼吸很浅
- 低沉的鼾声或咯咯声
- 对名字、摇晃等反应迟钝
- 心跳/脉搏减慢
- 指尖和嘴唇呈蓝色或灰白色
- 瞳孔变小

如果有人在睡觉时发出 奇怪的声音,叫醒他 们。如果他们没有反 应,可以摇晃他们,呼 唤他们的名字,或用指 关节摩擦他们的胸骨。

千万不要让人 "睡过去"。

用药过量时的应对措施

1. 拨打或委托他人拨打 911。《好撒玛利亚人法》保护 您和用药过量者免受持有毒品指控。

Narcan 药效可持续30-90 分钟。在 Narcan 药效逐渐消失后,有人可能再次服用过量药物。可以在医疗中心继续治疗。

2. 注入一剂 Narcan

- 打开包装,取出鼻喷雾器,将拇指放在活塞上,两根 手指放在喷嘴上。请勿对鼻喷雾器进行测试或填料。
- 将喷嘴的尖端压入用药过量者任一鼻孔,直到手指接 触到用药过量者的鼻子底部。
- 用力按下活塞,释放药剂。
- **3.等待3分钟。**如果用药过量者无反应,可从其另一个鼻孔注入第二剂。
- **4. 如果用药过量者没有呼吸,**而您受过心肺复苏培训,请 开始执行心肺复苏。
- **5. 如果用药过量者还有呼吸**,请将其置于恢复体位。除非万不得已、否则不要让用药过量者独处。
- **6.** 摄入 Narcan 后,**出现戒断症状和意识模糊很常见。**当事人可能不记得发生了什么。在救援人员到达之前,尽量使其保持冷静。

从哪里获取更多的 Narcan

就近获取Narcan, 或要求以保密方式免费寄给您。扫描二维码访问网页 https://



从药房获取: 无需处方。华盛顿州有一项"全州

常备令",可作为通用处方。

个人商业保险:请向您的保险公司咨询承保范围和自付出例

医疗补助计划: Narcan 为免费, 索取数量不受限制。

当前药物成瘾者须知

不要独自使用成瘾药物。随身携带 Narcan。将存放 Narcan 的位置告诉身边人。

缓慢使用成瘾药物。从少量开始。如果感觉不适,就停止或减少使用。

Sound Pathways 注射器服务计划提供减低伤害用品、1:1 注射器更换、转诊等服务。扫描二维码访问 https://www.facebook.com/syringeservices。



用药过量的体征和症状

- 皮肤苍白、发黏
- 没有呼吸/呼吸很浅
- 低沉的鼾声或咯咯声
- 对名字、摇晃等反应迟钝
- 心跳/脉搏减慢
- 指尖和嘴唇呈蓝色或灰白色
- 瞳孔变小

如果有人在睡觉时发出 奇怪的声音,叫醒他

可怪的严盲, 叫胜他 们。如果他们没有反

应,可以摇晃他们,呼唤他们的名字,或用指

关节摩擦他们的胸骨。

千万不要让人 "睡过去"。

用药过量时的应对措施

1. 拨打或委托他人拨打 911。《好撒玛利亚人法》保护 您和用药过量者免受持有毒品指控。

Narcan 药效可持续30-90 分钟。在 Narcan 药效逐渐消失后,有人可能再次服用过量药物。可以在医疗中心继续治疗。

2. 注入一剂 Narcan

- 打开包装,取出鼻喷雾器,将拇指放在活塞上,两根 手指放在喷嘴上。请勿对鼻喷雾器进行测试或填料。
- 将喷嘴的尖端压入用药过量者任一鼻孔,直到手指接 触到用药过量者的鼻子底部。
- 用力按下活塞,释放药剂。
- 3. 等待3分钟。如果用药过量者无反应,可从其另一个鼻孔注入第二剂。
- **4. 如果用药过量者没有呼吸,**而您受过心肺复苏培训,请 开始执行心肺复苏。
- **5. 如果用药过量者还有呼吸**,请将其置于恢复体位。除非万不得已,否则不要让用药过量者独处。
- 6. 摄入 Narcan 后,出现戒断症状和意识模糊很常见。当事人可能不记得发生了什么。在救援人员到达之前,尽量使其保持冷静。

从哪里获取更多的 Narcan

就近获取Narcan, 或要求以保密方式免费寄给您。扫描二维码访问网页 https://

stopoverdose.org o

从药房获取: 无需处方。华盛顿州有一项"全州

常备令",可作为通用处方。

个人商业保险:请向您的保险公司咨询承保范围和自付

医疗补助计划: Narcan 为免费、索取数量不受限制。

当前药物成瘾者须知

不要独自使用成瘾药物。随身携带 Narcan。将存放 Narcan 的位置告诉身边人。

缓慢使用成瘾药物。从少量开始。如果感觉不适,就停止或减少使用。

Sound Pathways 注射器服务计划提供减低伤害用品、1:1 注射器更换、转诊等服务。扫描二维码访问 https://www.facebook.com/syringeservices。



用药过量的体征和症状

- 皮肤苍白、发黏
- 没有呼吸/呼吸很浅
- 低沉的鼾声或咯咯声
- 对名字、摇晃等反应迟钝
- 心跳/脉搏减慢
- 指尖和嘴唇呈蓝色或灰白色
- 瞳孔变小

如果有人在睡觉时发出 奇怪的声音,叫醒他 们。如果他们没有反 应,可以摇晃他们,呼 唤他们的名字,或用指 关节摩擦他们的胸骨。

千万不要让人 "睡过去"。

用药过量时的应对措施

1. 拨打或委托他人拨打 911。 《好撒玛利亚人法》保护 您和用药过量者免受持有毒品指控。

Narcan 药效可持续30-90 分钟。在 Narcan 药效逐渐消失后,有人可能再次服用过量药物。可以在医疗中心继续治疗。

2. 注入一剂 Narcan

- 打开包装,取出鼻喷雾器,将拇指放在活塞上,两根 手指放在喷嘴上。请勿对鼻喷雾器进行测试或填料。
- 将喷嘴的尖端压入用药过量者任一鼻孔,直到手指接触到用药过量者的鼻子底部。
- 用力按下活塞,释放药剂。
- 3. 等待3分钟。如果用药过量者无反应,可从其另一个鼻孔注入第二剂。
- **4. 如果用药过量者没有呼吸,**而您受过心肺复苏培训,请 开始执行心肺复苏。
- **5. 如果用药过量者还有呼吸**,请将其置于恢复体位。除非万不得已、否则不要让用药过量者独处。
- 6. 摄入 Narcan 后,出现戒断症状和意识模糊很常见。当事人可能不记得发生了什么。在救援人员到达之前,尽量使其保持冷静。

从哪里获取更多的 Narcan

就近获取Narcan, 或要求以保密方式免费寄给您。扫描二维码访问网页 https://

stopoverdose.org.

从药房获取: 无需处方。华盛顿州有一项"全州 常备令",可作为通用处方。

个人商业保险:请向您的保险公司咨询承保范围和自付

医疗补助计划: Narcan 为免费、索取数量不受限制。

当前药物成瘾者须知

不要独自使用成瘾药物。随身携带 Narcan。将存放 Narcan 的位置告诉身边人。

缓慢使用成瘾药物。从少量开始。如果感觉不适,就停 止或减少使用。

Sound Pathways 注射器服务计划提供减低伤害用品、1:1 注射器更换、转诊等服务。扫描二维码访问 https://www.facebook.com/syringeservices。

