

ОКРУГ СНОХОМИШ

SNOHOMISH OVERDOSE PREVENTION

A COMMUNITY COMING TOGETHER TO STOP
SNOHOMISH COUNTY'S OPIOID EPIDEMIC

Реабилитационные центры округа Снохомиш

Evergreen Recovery Centers, (425) 493-5310

- В городах Эверетт и Линвуд. Амбулаторное лечение, детоксикация и заместительная терапия.

Ideal Option, 1(877) 522-1275

- В городах Арлингтон, Эверетт и Маунтлейк-Террас. Заместительная терапия, амбулаторное лечение, направление на когнитивно-поведенческую терапию.

Community Health Centers, (425) 789-3789 или 1(877) 382-4098

- В городах Арлингтон, Эдмондс, Эверетт и Линвуд. Программы поддержки наркозависимых, психиатрическая помощь и заместительная терапия.

Предотвращение злоупотребления опиоидами

Обсудите со своим лечащим врачом возможность назначения болеутоляющих препаратов, которые не вызывают привыкания.

Если вы принимаете опиоидные анальгетики, уточните у своего лечащего врача возможность кратковременного снижения дозы. Держите в доме препарат «Наркан».

Все лекарства должны храниться под замком: в запирающемся контейнере или шкафу.

Сдавайте неиспользованные, ненужные или просроченные лекарства. Наберите 1-844-633-7765 или отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт www.med-project.org/locations.



Службы помощи и реабилитации



Служба помощи штата Вашингтон
Для звонков и СМС: 1-866-789-1511.



Служба помощи Never Use Alone
1-877-696-1996



Служба помощи людям в суицидальном кризисе
Для звонков и СМС: 988.



Служба помощи для подростков
Для звонков и СМС: 1-866-833-6546.

Список ближайших центров реабилитации
Отсканируйте QR-код или перейдите на сайт <https://snohomishoverdoseprevention.com/find-treatment-or-support/>.



Russian

www.SnohomishOverdosePrevention.com

ОКРУГ СНОХОМИШ

SNOHOMISH OVERDOSE PREVENTION

A COMMUNITY COMING TOGETHER TO STOP
SNOHOMISH COUNTY'S OPIOID EPIDEMIC

Реабилитационные центры округа Снохомиш

Evergreen Recovery Centers, (425) 493-5310

- В городах Эверетт и Линвуд. Амбулаторное лечение, детоксикация и заместительная терапия.

Ideal Option, 1(877) 522-1275

- В городах Арлингтон, Эверетт и Маунтлейк-Террас. Заместительная терапия, амбулаторное лечение, направление на когнитивно-поведенческую терапию.

Community Health Centers, (425) 789-3789 или 1(877) 382-4098

- В городах Арлингтон, Эдмондс, Эверетт и Линвуд. Программы поддержки наркозависимых, психиатрическая помощь и заместительная терапия.

Предотвращение злоупотребления опиоидами

Обсудите со своим лечащим врачом возможность назначения болеутоляющих препаратов, которые не вызывают привыкания.

Если вы принимаете опиоидные анальгетики, уточните у своего лечащего врача возможность кратковременного снижения дозы. Держите в доме препарат «Наркан».

Все лекарства должны храниться под замком: в запирающемся контейнере или шкафу.

Сдавайте неиспользованные, ненужные или просроченные лекарства. Наберите 1-844-633-7765 или отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт www.med-project.org/locations.



Службы помощи и реабилитации



Служба помощи штата Вашингтон
Для звонков и СМС: 1-866-789-1511.



Служба помощи Never Use Alone
1-877-696-1996



Служба помощи людям в суицидальном кризисе
Для звонков и СМС: 988.



Служба помощи для подростков
Для звонков и СМС: 1-866-833-6546.

Список ближайших центров реабилитации
Отсканируйте QR-код или перейдите на сайт <https://snohomishoverdoseprevention.com/find-treatment-or-support/>.



Russian

www.SnohomishOverdosePrevention.com

ОКРУГ СНОХОМИШ

SNOHOMISH OVERDOSE PREVENTION

A COMMUNITY COMING TOGETHER TO STOP
SNOHOMISH COUNTY'S OPIOID EPIDEMIC

Реабилитационные центры округа Снохомиш

Evergreen Recovery Centers, (425) 493-5310

- В городах Эверетт и Линвуд. Амбулаторное лечение, детоксикация и заместительная терапия.

Ideal Option, 1(877) 522-1275

- В городах Арлингтон, Эверетт и Маунтлейк-Террас. Заместительная терапия, амбулаторное лечение, направление на когнитивно-поведенческую терапию.

Community Health Centers, (425) 789-3789 или 1(877) 382-4098

- В городах Арлингтон, Эдмондс, Эверетт и Линвуд. Программы поддержки наркозависимых, психиатрическая помощь и заместительная терапия.

Предотвращение злоупотребления опиоидами

Обсудите со своим лечащим врачом возможность назначения болеутоляющих препаратов, которые не вызывают привыкания.

Если вы принимаете опиоидные анальгетики, уточните у своего лечащего врача возможность кратковременного снижения дозы. Держите в доме препарат «Наркан».

Все лекарства должны храниться под замком: в запирающемся контейнере или шкафу.

Сдавайте неиспользованные, ненужные или просроченные лекарства. Наберите 1-844-633-7765 или отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт www.med-project.org/locations.



Службы помощи и реабилитации



Служба помощи штата Вашингтон
Для звонков и СМС: 1-866-789-1511.



Служба помощи Never Use Alone
1-877-696-1996



Служба помощи людям в суицидальном кризисе
Для звонков и СМС: 988.



Служба помощи для подростков
Для звонков и СМС: 1-866-833-6546.

Список ближайших центров реабилитации
Отсканируйте QR-код или перейдите на сайт <https://snohomishoverdoseprevention.com/find-treatment-or-support/>.



Russian

www.SnohomishOverdosePrevention.com

Симптомы передозировки

- Бледная, липкая кожа.
- Остановка дыхания или поверхностное дыхание.
- Шумное дыхание или булькающие хрипы.
- Человек не откликается на свое имя, не реагирует на прикосновения и т. д.
- Замедленное сердцебиение/пульс.
- Посиневшие или посеревшие кончики пальцев и губы.
- Суженные зрачки.

Если спящий человек издает странные звуки, разбудите его. Если он не реагирует, потрясите его за плечо, позвоните по имени или разотрите грудину костяшками пальцев.

Не позволяйте человеку, принявшему наркотические вещества «просто проспать».

Первая помощь при передозировке

1. Позвоните или попросите кого-нибудь позвонит в службу спасения 911. «Закон доброго самаритянина» защищает вас и человека, пострадавшего от передозировки, от обвинения в хранении наркотических веществ.

Действие «Наркана» длится 30–90 минут. После этого человек может снова оказаться в состоянии передозировки. Дальнейшую медицинскую помощь могут оказать сотрудники медицинского центра.

2. Введите пострадавшему одну дозу «Наркана».

- Достаньте препарат из упаковки. Поместите большой палец на поршень, придерживая наконечник распылителя двумя пальцами. Не тестируйте и не проверяйте работоспособность распылителя.
- Введите наконечник в одну ноздрю пока ваши пальцы не коснутся носа пострадавшего.
- Уверенно нажмите на поршень для подачи дозы препарата.

3. Подождите три минуты. Если человек не пришел в сознание, введите вторую дозу в другую ноздрю.

4. Если дыхание не восстановилось, а вы прошли обучение сердечно-легочной реанимации (СЛР), начните СЛР.

5. При восстановлении дыхания поместите пострадавшего в спасительное положение. Не оставляйте его без присмотра, за исключением случаев крайней необходимости.

6. Симптом отмены и спутанность сознания часто возникают после применения «Наркана». Человек может не помнить, что случилось. Постарайтесь успокоить его до прибытия помощи.

Где можно получить «Наркан»

Найдите ближайший пункт выдачи «Наркана» или закажите бесплатную анонимную доставку по почте. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт <https://stopoverdose.org>.



Приобретите в аптеке: препарат выдается без рецепта. На всей территории штата Вашингтон действует врачебное назначение, которое выступает в роли универсального рецепта.

Обратитесь в свою страховую компанию: уточните, что входит в страховое покрытие вашего полиса.

Программа Medicaid предусматривает бесплатное и безлимитное предоставление «Наркана».

Памятка для наркозависимых

Никогда не употребляйте наркотические вещества в одиночестве. Всегда держите при себе «Наркан». Расскажите всем присутствующим, где вы храните «Наркан».

Вводите наркотические вещества медленно. Начиная с небольших доз. Остановитесь или уменьшите объем вещества, если почувствуете необычные симптомы.

Sound Pathways Syringe Service Program предлагает расходные материалы для снижения вреда, обмен шприцев «один к одному», выдачу направлений к специалистам и многое другое. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт <https://www.facebook.com/syringeservices>.



Симптомы передозировки

- Бледная, липкая кожа.
- Остановка дыхания или поверхностное дыхание.
- Шумное дыхание или булькающие хрипы.
- Человек не откликается на свое имя, не реагирует на прикосновения и т. д.
- Замедленное сердцебиение/пульс.
- Посиневшие или посеревшие кончики пальцев и губы.
- Суженные зрачки.

Если спящий человек издает странные звуки, разбудите его. Если он не реагирует, потрясите его за плечо, позвоните по имени или разотрите грудину костяшками пальцев.

Не позволяйте человеку, принявшему наркотические вещества «просто проспать».

Первая помощь при передозировке

1. Позвоните или попросите кого-нибудь позвонит в службу спасения 911. «Закон доброго самаритянина» защищает вас и человека, пострадавшего от передозировки, от обвинения в хранении наркотических веществ.

Действие «Наркана» длится 30–90 минут. После этого человек может снова оказаться в состоянии передозировки. Дальнейшую медицинскую помощь могут оказать сотрудники медицинского центра.

2. Введите пострадавшему одну дозу «Наркана».

- Достаньте препарат из упаковки. Поместите большой палец на поршень, придерживая наконечник распылителя двумя пальцами. Не тестируйте и не проверяйте работоспособность распылителя.
- Введите наконечник в одну ноздрю пока ваши пальцы не коснутся носа пострадавшего.
- Уверенно нажмите на поршень для подачи дозы препарата.

3. Подождите три минуты. Если человек не пришел в сознание, введите вторую дозу в другую ноздрю.

4. Если дыхание не восстановилось, а вы прошли обучение сердечно-легочной реанимации (СЛР), начните СЛР.

5. При восстановлении дыхания поместите пострадавшего в спасительное положение. Не оставляйте его без присмотра, за исключением случаев крайней необходимости.

6. Симптом отмены и спутанность сознания часто возникают после применения «Наркана». Человек может не помнить, что случилось. Постарайтесь успокоить его до прибытия помощи.

Где можно получить «Наркан»

Найдите ближайший пункт выдачи «Наркана» или закажите бесплатную анонимную доставку по почте. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт <https://stopoverdose.org>.



Приобретите в аптеке: препарат выдается без рецепта. На всей территории штата Вашингтон действует врачебное назначение, которое выступает в роли универсального рецепта.

Обратитесь в свою страховую компанию: уточните, что входит в страховое покрытие вашего полиса.

Программа Medicaid предусматривает бесплатное и безлимитное предоставление «Наркана».

Памятка для наркозависимых

Никогда не употребляйте наркотические вещества в одиночестве. Всегда держите при себе «Наркан». Расскажите всем присутствующим, где вы храните «Наркан».

Вводите наркотические вещества медленно. Начиная с небольших доз. Остановитесь или уменьшите объем вещества, если почувствуете необычные симптомы.

Sound Pathways Syringe Service Program предлагает расходные материалы для снижения вреда, обмен шприцев «один к одному», выдачу направлений к специалистам и многое другое. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт <https://www.facebook.com/syringeservices>.



Симптомы передозировки

- Бледная, липкая кожа.
- Остановка дыхания или поверхностное дыхание.
- Шумное дыхание или булькающие хрипы.
- Человек не откликается на свое имя, не реагирует на прикосновения и т. д.
- Замедленное сердцебиение/пульс.
- Посиневшие или посеревшие кончики пальцев и губы.
- Суженные зрачки.

Если спящий человек издает странные звуки, разбудите его. Если он не реагирует, потрясите его за плечо, позвоните по имени или разотрите грудину костяшками пальцев.

Не позволяйте человеку, принявшему наркотические вещества «просто проспать».

Первая помощь при передозировке

1. Позвоните или попросите кого-нибудь позвонит в службу спасения 911. «Закон доброго самаритянина» защищает вас и человека, пострадавшего от передозировки, от обвинения в хранении наркотических веществ.

Действие «Наркана» длится 30–90 минут. После этого человек может снова оказаться в состоянии передозировки. Дальнейшую медицинскую помощь могут оказать сотрудники медицинского центра.

2. Введите пострадавшему одну дозу «Наркана».

- Достаньте препарат из упаковки. Поместите большой палец на поршень, придерживая наконечник распылителя двумя пальцами. Не тестируйте и не проверяйте работоспособность распылителя.
- Введите наконечник в одну ноздрю пока ваши пальцы не коснутся носа пострадавшего.
- Уверенно нажмите на поршень для подачи дозы препарата.

3. Подождите три минуты. Если человек не пришел в сознание, введите вторую дозу в другую ноздрю.

4. Если дыхание не восстановилось, а вы прошли обучение сердечно-легочной реанимации (СЛР), начните СЛР.

5. При восстановлении дыхания поместите пострадавшего в спасительное положение. Не оставляйте его без присмотра, за исключением случаев крайней необходимости.

6. Симптом отмены и спутанность сознания часто возникают после применения «Наркана». Человек может не помнить, что случилось. Постарайтесь успокоить его до прибытия помощи.

Где можно получить «Наркан»

Найдите ближайший пункт выдачи «Наркана» или закажите бесплатную анонимную доставку по почте. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт <https://stopoverdose.org>.



Приобретите в аптеке: препарат выдается без рецепта. На всей территории штата Вашингтон действует врачебное назначение, которое выступает в роли универсального рецепта.

Обратитесь в свою страховую компанию: уточните, что входит в страховое покрытие вашего полиса.

Программа Medicaid предусматривает бесплатное и безлимитное предоставление «Наркана».

Памятка для наркозависимых

Никогда не употребляйте наркотические вещества в одиночестве. Всегда держите при себе «Наркан». Расскажите всем присутствующим, где вы храните «Наркан».

Вводите наркотические вещества медленно. Начиная с небольших доз. Остановитесь или уменьшите объем вещества, если почувствуете необычные симптомы.

Sound Pathways Syringe Service Program предлагает расходные материалы для снижения вреда, обмен шприцев «один к одному», выдачу направлений к специалистам и многое другое. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на сайт <https://www.facebook.com/syringeservices>.

